



FICHE SANTÉ DINDON



L'HISTOMONOSE

L'histomonose, ou **maladie de la tête noire**, est une infection parasitaire grave chez les dindons, causée par le protozoaire *Histomonas meleagridis*. Elle entraîne des lésions au foie et au cæcum.

Pour éviter l'histomonose chez les dindons, il faut lutter contre le parasite *Heterakis gallinarum* (vecteur d'*Histomonas meleagridis*).

Pour cela, il est nécessaire de **vermifuger régulièrement**.

Symptômes

Les symptômes apparaissent généralement **7 à 12 jours après l'infection** et peuvent inclure :

- Prostration et apathie
- Diarrhée de couleur jaune soufre
- Amaigrissement rapide
- Lésions au niveau du foie et du cæcum

Conséquences

L'histomonose peut entraîner des **taux de mortalité élevés**, en particulier chez les jeunes dindons, qui sont les plus sensibles à cette infection.

Les cas peuvent évoluer rapidement, entraînant la mort **en quelques jours** après l'apparition des symptômes.

Prévention

- Maintenir un environnement propre, éviter la surpopulation et ne pas élever les dindons avec d'autres espèces de volailles.
- Un changement régulier de la litière et l'utilisation de vermifuges à base de lévamisole (*Biaminthic*, *Capizol*) peuvent également aider à prévenir l'infection.
- **Si vous gardez vos dindons avec d'autres oiseaux de basse-cour**, vermifugez-les très régulièrement (toutes les 6 semaines) avec *Gallifen* (fenbendazole à 1 mg/kg sur 5 jours consécutifs). Ce vermifuge peut être administré aux poules pondeuses, et les œufs restent consommables.

Traitement

Il est crucial de consulter un vétérinaire pour un diagnostic précis et des conseils appropriés. Le seul traitement efficace est à base de **métronidazole** (*Alazol*), mais il est interdit pour les volailles destinées à la consommation.

En résumé :

L'histomonose est une maladie sérieuse qui nécessite une attention particulière pour la prévention et la gestion de la santé des dindons.